

Vaccin anti COVID-19 de Johnson & Johnson : Ce que vous devez savoir

TRANSCRIPTION

[musique entraînante]

[Narration]

Vaccin anti COVID-19 de Johnson & Johnson : Ce que vous devez savoir

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (*Centers for Disease Control and Prevention -- CDC*) recommandent désormais les vaccins COVID-19 (Pfizer et Moderna) au lieu du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson.

Pourquoi les recommandations ont-elles été mises à jour ?

Les experts ont noté que le rare problème de coagulation du sang survenant après la vaccination Johnson & Johnson anti COVID-19 a causé quelques décès. Bien que ce problème soit rare, il est très grave, et il existe d'autres vaccins disponibles qui ne présentent pas ce même risque. Les experts ont mis à jour leurs recommandations après avoir examiné les recherches actuelles sur l'efficacité et la sécurité du vaccin Johnson & Johnson. Ils continuent à examiner la sécurité de tous les vaccins et, si nécessaire, à mettre à jour leurs recommandations sur la base de ces recherches. Toute tendance inhabituelle ou inattendue d'effets secondaires graves et rares est vérifiée et traitée, et les gens sont tenus informés.

Que se passe-t-il si j'ai déjà reçu le vaccin de Johnson & Johnson ?

Il est peu probable que vous risquiez encore de développer le problème rare de la coagulation due au vaccin de Johnson & Johnson si plus d'un mois s'est écoulé depuis que vous avez reçu le vaccin. Si cela fait moins d'un mois, surveillez l'apparition de ces symptômes :

- essoufflement ;
- douleur thoracique ;
- gonflement des jambes ;
- des douleurs abdominales/de l'estomac qui ne disparaissent pas ;
- maux de tête sévères ou qui ne disparaissent pas ;
- vision floue ;
- ecchymoses faciles ou petites taches de sang sous la peau au-delà du site d'injection.

Si vous présentez l'un de ces symptômes après avoir reçu le vaccin, vous devez consulter immédiatement un médecin. Dites au prestataire de soins de santé que vous avez récemment reçu le vaccin de Johnson & Johnson. Le vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson donne une protection contre le développement de maladies graves dues à la COVID-19 ; cependant, les personnes qui ont reçu une injection du vaccin de Johnson & Johnson doivent rester à jour et recevoir une injection de rappel deux mois après leur première injection. Les vaccins Pfizer ou Moderna sont recommandés pour l'injection de rappel.

Dois-je recevoir un autre vaccin ?

Vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro avec un vaccin différent si votre premier vaccin était le Johnson & Johnson. Si vous avez déjà reçu une injection de rappel de Johnson & Johnson, vous n'avez pas besoin d'autres injections pour le moment.

Puis-je encore obtenir le vaccin de Johnson & Johnson si je le souhaite ?

Vous pouvez toujours obtenir le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson si c'est le vaccin que vous souhaitez. Sachez que toute personne peut développer des caillots sanguins rares après avoir reçu le vaccin. Cependant, les caillots surviennent le plus souvent chez les femmes âgées de 30 à 49 ans. Discutez du vaccin avec votre fournisseur de vaccins et de ses risques éventuels.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19. Si vous n'êtes pas vacciné(e), parlez-en à votre prestataire de soins de santé ou trouvez un endroit près de chez vous pour vous faire vacciner.

[musique entraînante]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2/4/22 (French)

Pour obtenir ces informations dans un format différent,appelez le 651-201-4989