

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ຂໍ້ຄວາມ

[ຈັງຫວະເພັງ]

[ການເລົ່າເລື່ອງ]

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້

ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 (ໄຟເຊີ້ ແລະ ໂມເດີນນາ) ແທນການນຳໃຊ້ວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ.

ເປັນຫຍັງຄຳແນະນຳຈຶ່ງຖືກປັບປຸງ?

ຜູ້ຊ່ວຍຊານໄດ້ລະບຸວ່າ ບັນຫາກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຖິງວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກກໍຕາມ, ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະ ຍັງມີວັກຊີນຊະນິດອື່ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຄືແນວນີ້.

ຜູ້ຊ່ວຍຊານໄດ້ປັບປຸງຄຳແນະນຳຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄົ້ນຄວ້າການເຮັດວຽກຂອງວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງມັນ. ພວກເຂົາຍັງຄົງສືບຕໍ່ຕິດຕາມວັກຊີນທັງໝົດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖ້າວ່າຈຳເປັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຳແນະນຳຂອງພວກເຂົາອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ. ທຸກໆຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼືບໍ່ຄາດຄິດ ຂອງຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຫາຍາກ ແມ່ນໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ, ແລະ ປະຊາຊົນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້.

ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ຮັບວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດ?

ທ່ານອາດຈະຍັງຄົງບໍ່ມີອາການຂອງບັນຫາເສັ້ນອຸດຕັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກຈາກການສັກວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ. ຖ້າວ່າໄດ້ຮັບການສັກຢາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ, ໃຫ້ຕິດຕາມອາການເຫຼົ່ານີ້:

- ຫາຍໃຈຖີ່ແລະສັ່ນ
- ເຈັບໜ້າເອິກ
- ຂາໃຄ່
- ເຈັບທ້ອງ/ປອດທ້ອງບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
- ອາການເຈັບຫົວ ຫຼື ເຈັບຫົວຮຸນແຮງບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ
- ຕາມົວ
- ມີຮອຍຊ້ຳ ຫຼື ເປັນຕຸ່ມເລືອດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນບ່ອນສັກຢາ

ຖ້າທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ທ່ານຄວນຈະໄປພົບແພດທັນທີ. ຈົ່ງບອກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນແລ້ວ. ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຂັ້ນຮຸນແຮງອັນເນື່ອງມາຈາກໂຄວິດ-19; ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໜຶ່ງເຂັມຂອງ ຈອນສັນແອນ

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້

ຈອນສັນ ຍັງຄົງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັ້ມກະຕຸ້ນ ສອງເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສັກເຂັ້ມທຳອິດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນວັກຊີນໄຟເຊີ ຫຼື ໂມເດີນນາ ແມ່ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນເຂັ້ມກະຕຸ້ນ.

ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຊະນິດຕ່າງກັນບໍ?

ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສັກຢາວັກຊີນຊະນິດຕ່າງກັນ ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ສັກຢາຈອນສັນແອນຈອນສັນເປັນເຂັ້ມທຳອິດແລ້ວ. ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຂັ້ມກະຕຸ້ນຈອນສັນແອນຈອນສັນແລ້ວ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສັກອີກໃນເວລານີ້.

ຂ້ອຍຍັງສາມາດສັກຢາວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ໄດ້ບໍ່ຖ້າວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການ?

ທ່ານຍັງຄົງສາມາດຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນແອນຈອນສັນໄດ້ ຖ້າວ່າມັນເປັນວັກຊີນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຈົ່ງຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າ ທຸກໆຄົນອາດຈະເກີດບັນຫາເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນທີ່ເກີດຂຶ້ນມັກຈະເກີດກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 30 ປີ ເຖິງ 49 ປີ. ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວັກຊີນແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນທ່ານເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການເປັນໂຄວິດ-19. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ບອກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫຼື ຄົນຫາສະຖານທີ່ ທີ່ໃກ້ກັບທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮັບວັກຊີນ.

[ຈົ່ງຫວະເພັງ]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2/4/22 (Lao)

ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຮູບແບບອື່ນ, ຈົ່ງໂທຫາ: 651-201-4989