

Вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson: что следует знать

ТЕКСТОВАЯ РАСШИФРОВКА

[Оптимистичная музыка]

[Голос диктора]

Вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson: что следует знать

В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) рекомендует вместо вакцины против COVID-19 компании Johnson & Johnson использовать вакцины против COVID-19 Pfizer и Moderna.

Почему рекомендации были изменены?

Эксперты установили, что редкий эффект свертываемости крови, возникающий после прививки вакциной против COVID-19 от Johnson & Johnson, стал причиной нескольких смертей. Хотя такие случаи редки, это очень серьезная проблема, в то время как существуют другие вакцины, с которыми такой риск не связан. Эксперты обновили рекомендации после проведения исследований эффективности и безопасности вакцины Johnson & Johnson. Они продолжают анализировать все вакцины на предмет их безопасности и при необходимости на основе этих исследований обновляют свои рекомендации. Любые необычные или неожиданные проявления редких серьезных побочных эффектов проверяются и устраняются, а людей информируют.

Что делать, если я уже получил(а) вакцину Johnson & Johnson?

Если с момента вакцинации прошло больше месяца, то маловероятно, что у вас ещё может развиваться редкий эффект свертывания крови, вызванный вакциной Johnson & Johnson. Если прошло меньше месяца, обратите внимание на такие симптомы:

- Затрудненное дыхание
- Боли за грудиной
- Отечность ног
- Непроходящая боль в брюшной полости/желудке
- Сильные или непроходящие головные боли
- Помутнение зрения
- Легкие синяки или мелкие кровяные пятна под кожей за пределами зоны инъекции

Если после введения вакцины у вас появились какие-либо из этих симптомов, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Сообщите медработнику, что вы недавно получили вакцину Johnson & Johnson. Вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson защищает от тяжёлого течения заболевания COVID-19; однако людям, получившим одну дозу вакцины Johnson & Johnson, всё равно необходимо следить за свежей информацией и через два месяца после первой дозы сделать бустерную прививку. Для бустерной прививки рекомендуется вакцина Pfizer либо Moderna.

Нужно ли мне делать прививку другой вакциной?

Если ваша первая прививка была сделана вакциной Johnson & Johnson, вам не нужно заново вводить другую вакцину. Если вы уже сделали бустерную прививку вакциной Johnson & Johnson, вам на данный момент больше не нужно делать никаких прививок.

Если я предпочитаю вакцину Johnson & Johnson, можно ли мне продолжать её получать?

Если вы предпочитаете вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson, можете продолжать вакцинироваться ею. Помните, что после вакцинации у любого человека могут в редких случаях образовываться тромбы. Однако чаще всего тромбы возникают у женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Проконсультируйтесь в пункте вакцинации о выбранной вакцине и её возможных рисках.

Вакцинация — лучший способ защитить себя и окружающих от COVID-19. Если вы не вакцинированы, обратитесь к своему семейному врачу или найдите пункт, где можно сделать прививку.

[оптимистичная музыка]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2/4/22 (Russian)

Для получения этой информации в другом формате позвоните по тел. 651-201-4989