

Thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson: Những điều quý vị cần biết

BẢN GHI

[nhạc vui]

[Phản trình bày]

Thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson: Những điều quý vị cần biết

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) hiện khuyến nghị nên sử dụng hai loại thuốc chủng ngừa COVID-19 (Pfizer và Moderna) thay vì thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson.

Tại sao CDC cập nhật khuyến nghị?

Các nhà chuyên môn nhận định rằng vấn đề đông máu hiếm gặp xảy ra sau khi chích thuốc chủng ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson đã khiến một số người tử vong. Mặc dù đây là trường hợp hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, trong khi đó đang có những loại thuốc chủng ngừa khác không gây ra nguy cơ này. Các nhà chuyên môn đã cập nhật các khuyến nghị sau khi đánh giá nghiên cứu hiện tại về hiệu quả và độ an toàn của thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson. Họ sẽ tiếp tục đánh giá độ an toàn của tất cả các loại thuốc chủng ngừa và nếu cần sẽ cập nhật các khuyến nghị dựa trên nghiên cứu đó. Mọi phản ứng phụ nghiêm trọng hiếm gặp xảy ra bất thường hoặc không mong muốn đều được kiểm tra và giải quyết, và người dân sẽ được cập nhật thông tin.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã chích thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson?

Nếu đã qua hơn một tháng kể từ khi chích thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson thì quý vị sẽ không còn có thể bị chứng đông máu hiếm gặp do chích thuốc chủng ngừa này. Còn nếu chưa đến một tháng thì hãy để ý các triệu chứng sau:

- Thở dốc
- Đau thắt ngực
- Sưng chân
- Đau bụng/đau dạ dày dai dẳng
- Nhức đầu dữ dội hoặc nhức đầu dai dẳng
- Mất mờ
- Dễ bị bầm hoặc có những chấm máu nhỏ li ti ở dưới da không chỉ ở nơi chích mũi kim

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào như vậy sau khi chích ngừa, quý vị nên đi khám ngay. Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây biết là quý vị vừa mới chích ngừa bằng thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson. Thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson bảo vệ quý vị không bị bệnh nặng nếu nhiễm COVID-19; tuy nhiên, những người đã chích một mũi thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson vẫn cần cập nhật và chích mũi nhắc lại hai tháng sau mũi đầu tiên. Nên chích mũi nhắc lại bằng thuốc chủng ngừa Pfizer hoặc Moderna.

Tôi có cần chích ngừa một loại thuốc chủng ngừa khác không?

Quý vị không cần phải chích thuốc chủng ngừa khác lại từ đầu nếu đã chích mũi đầu tiên là thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson. Nếu đã chích mũi nhắc lại là thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson thì quý vị không cần chích thêm thuốc chủng ngừa nào vào lúc này.

Tôi vẫn có thể chích thuốc chủng ngừa Johnson & Johnson nếu tôi muốn phải không?

Quý vị vẫn có thể chích thuốc chủng ngừa COVID-19 Johnson & Johnson nếu đó là loại thuốc chủng ngừa quý vị muốn chích. Lưu ý rằng huyết khối hiếm gặp sau khi chích ngừa có thể xuất hiện ở bất kỳ người nào. Tuy nhiên, tình trạng đông máu này thường xảy ra nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 30-49. Hãy trao đổi với nhà cung cấp thuốc chủng ngừa của quý vị về thuốc chủng ngừa và các nguy cơ có thể xảy ra.

Chủng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác khỏi COVID-19. Nếu quý vị chưa chích ngừa, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc tìm một địa điểm chích ngừa ở gần quý vị để chích ngừa.

[nhạc vui]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2/4/22 (Vietnamese)

Để có được thông tin này dưới định dạng khác, vui lòng gọi: 651-201-4989